



**Olimpiada Națională Gazeta Matematică
(ONGM) 2020-2021**
Organizator local Upper.School

**Etapa I
Clasa a-X-a**

- Subiecte -

Subiecte elaborate de SSMR - Filiala Gorj

§1 Subiecte

Problema 1

Soluțiile ecuației $\left(\sqrt{5+2\sqrt{6}}\right)^x + \left(\sqrt{5-2\sqrt{6}}\right)^x = 10$ sunt:

- a) $\{\pm 1\}$
- b) $\{\pm 2\}$
- c) $\{\pm\sqrt{2}\}$
- d) $\left\{\pm\frac{1}{2}\right\}$
- e) $\{\pm 4\}$

Problema 2

Să se rezolve ecuația: $3\lg^2(x^2) - \lg x - 1 = 0$

- a) $x_{1,2} = \pm\sqrt[3]{10}$
- b) $x_{1,2} = \pm\sqrt[4]{10}$
- c) $x_1 = \sqrt[3]{10}, x_2 = \sqrt[3]{10^{-1}}$
- d) $x_1 = \sqrt[3]{10}, x_2 = \sqrt[4]{10^{-1}}$
- e) nu admite soluții

Problema 3

Să se rezolve inecuația: $9^x - 5 \cdot 3^x + 6 < 0$

- a) $x \in (2, 3)$
- b) $x \in (0, 3) \cup (3, \infty)$
- c) $x \in (1, \infty)$
- d) $x \in \left(\frac{\ln 2}{\ln 3}, 1\right)$
- e) $x = 3$

Problema 4

Cea mai mare valoare pe care o poate lua funcția: $f : (0, \infty) \rightarrow R$,

$$f(x) = (\log_3 x)^2 + 2(\log_3 x) \cdot \left(\log_3 \frac{9}{x}\right)$$

este:

- a) 100
- b) 10
- c) 1
- d) 4
- e) 64

Problema 5

Fie $a \in (0, 1)$ și numerele $m = a^{1+\sqrt{6}}$ și $n = a^{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$. Atunci:

- a) $m > n$
- b) $m + n = 2$
- c) $m + n > 2$
- d) $m < n$
- e) $m^{1+\sqrt{6}} = n^{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$

Problema 6

Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{4^x - 6^x + 9^x}{4^x + 6^x + 9^x}$. Notăm $I = f(\mathbb{R})$. Atunci:

- a) $I = [0, 1]$
- b) $I = \left[\frac{1}{3}, 3\right]$
- c) $I = \left[\frac{1}{3}, 1\right)$
- d) $I = \left[\frac{1}{3}, \infty\right]$
- e) $I = (0, 1)$

Problema 7

Să se rezolve inecuația $\log_x(3x) \leq 2$

- a) $x \in (0, 1) \cup [3, \infty)$
- b) $x \in (3, \infty)$
- c) $x = 3$
- d) $x \in (0, 3)$
- e) $x = 1$

Problema 8

Fie $A \subset \mathbb{R}$ mulțimea soluțiilor inecuației $2^{\sqrt{4-x}} < 4^{\frac{x}{2}}$. Atunci:

- a) $A = \left(-\infty, \frac{-1 + \sqrt{17}}{2}\right)$
- b) $A = (0, \infty)$
- c) $A = \left(\frac{-1 + \sqrt{17}}{2}, 4\right]$
- d) $A = (0, 4)$
- e) $A = (-\infty, 4)$

Problema 9

Determinați mulțimea:

$$A = \left\{ x \in \mathbb{R} \middle| \log_9^2 x \geq \log_3^2 \sqrt{1 - \frac{x}{4}} \right\}$$

- a) $A = \left(0, \frac{4}{5}\right)$
- b) $A = (0, 4)$
- c) $A = (0, 2)$
- d) $A = \emptyset$
- e) $A = \left(0, \frac{4}{5}\right] \cup \{2\}$

Problema 10

Suma soluțiilor reale ale ecuației $\sqrt{x} + \sqrt[3]{8-x} = 2$ este:

- a) 0
- b) 10
- c) 25
- d) -25
- e) 27

Problema 11

Produsul soluțiilor reale ale ecuației $\sqrt[3]{x^3 + 7} + \sqrt[3]{x + 7} = 4$ este:

- a) $\frac{1}{2}$
- b) 0
- c) 1
- d) -1
- e) 4

Problema 12

Fie S mulțimea soluțiilor reale ale ecuației: $\frac{2^x}{x} + x \cdot 2^{\frac{1}{x}} = 4$ atunci:

- a) $S \subset [1, 3)$
- b) $S \subset (0, 1)$
- c) $S = \{2, 7\}$
- d) $S = \emptyset$
- e) $S = \mathbb{R}$

Problema 13

Pentru orice $a \in \mathbb{R}$, fie funcția $f = \begin{cases} ax + 2, & x \leq 1 \\ x + 2a, & x > 1 \end{cases}$ și fie $A = \{a \in \mathbb{R} / f \text{ este injectivă}\}$ și $B = \{a \in \mathbb{R} / f \text{ este surjectivă}\}$. Atunci:

- a) $A = [2, \infty), B = (0, 1]$
- b) $A = [-1, 1), B = (0, 1]$
- c) $A = [1, \infty), B = (0, 1]$
- d) $A = [1, \infty), B = (-1, 1]$
- e) $A = [1, \infty), B = (0, 2]$

Problema 14

Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x + 4$. Să se determine funcția $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dacă

$$(f \circ g \circ f^{-1})(x) = \frac{3}{2}x + 1, \forall x \in \mathbb{R}$$

- a) $g(x) = -\frac{3}{2}x + 1$
- b) $g(x) = \frac{3}{2}x - 1$
- c) $g(x) = \frac{5}{2}x - 1$
- d) $g(x) = \frac{3}{2}x + 1$
- e) nu există g cu proprietatea din enunt.

Problema 15

Fie $a \in (1, \infty)$ și numerele $x = \sqrt[4^n-1]{(\sqrt{a} \cdot \sqrt[4]{a} \cdots \sqrt[2^n]{a})^{2^n}}$ și $y = \sqrt[n]{(\sqrt{a} \cdot \sqrt[6]{a} \cdots \sqrt[n(n+1)]{a})^{n+1}}$, $n \in \mathbb{N}^*$. Precizați dacă:

- a) $x > y$
- b) $x^{2^n+1} = y$
- c) $xy < 1$
- d) $xy > 1$
- e) $x = y$

Problema 16

Să se calculeze $E = \left(\frac{b}{c}\right)^{\lg a} \cdot \left(\frac{c}{a}\right)^{\lg b} \cdot \left(\frac{a}{b}\right)^{\lg c}$ pe domeniul de existență:

- a) $E = 0$
- b) $E = 2$
- c) $E = 10$
- d) $E = 1$
- e) $E = \frac{1}{10}$

Problema 17

Fie $a = \sqrt[3]{-24} + \sqrt[3]{81} - \sqrt[3]{9}$ și $b = 4\sqrt[4]{\frac{1}{162}} - 3\sqrt[4]{\frac{1}{32}} + \frac{1}{6} \cdot \sqrt[8]{\frac{1}{4}}$. Atunci:

- a) $a < b$
- b) $a = b$
- c) $a > b$
- d) $a + b = 2$
- e) $a + b = 0$

Problema 18

Mulțimea valorilor lui x pentru care există simultan expresiile: $\sqrt[3]{\frac{1}{4-x^2}}$ și $\log_2 \sqrt{-x^2 - x + 6}$

- a) \emptyset
- b) $(-3, 2) \setminus \{-2\}$
- c) $\mathbb{R} \setminus \{\pm 2\}$
- d) $(-3, 2)$
- e) \mathbb{R}^*

Problema 19

Fie S mulțimea soluțiilor reale ale ecuației $\log_x(x^2 + 2x) + \log_{x^2}(x + 2) = 4$ atunci

- a) $S \subset (0, 2)$ b) $S \subset [2, \infty)$ c) $S = \{4, 5\}$
d) $S = \emptyset$ e) $S = (0, \infty) - \{1\}$

Problema 20

Mulțimea soluțiilor inecuației $\sqrt{x+6} - \sqrt{x+1} > \sqrt{2x-5}$ este:

- a) $\left[\frac{5}{2}, \infty\right)$ b) $(3, \infty)$ c) \emptyset d) $[6, 8]$ e) $\left[\frac{5}{2}, 3\right)$